Indice

- Definizione
- Epidemiologia
- Buona Pratica Clinica
- Criticità & Diagnosi
- Criticità & Trattamento
- Presente & Futuro

DSM 5

Disturbi del Neurosviluppo

- Disabilità Intellettive
- Disturbi della Comunicazione
- Disturbi dello Spettro Autistico

Disturbo neurocognitivo dovuto ad altra condizione medica, con alterazione del comportamento

ICD 10

RM profondo, con disturbo del comportamento

- ✓ Nessun o minimo
- ✓ Evidente, che necessita di osservazione o terapia
- ✓ Altro disturbo del comportamento

Disturbi di Personalità e del Comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali

Altri Disturbi Psicici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche

Prevalence Mental Health Comorbidity – 30% (Cooper et al. 2007)
Prevalence Mental Health Comorbidity – 30% (Cooper et al. 2007)

- X Depressione – 30%
 - X Ansia – 21.3%
 - X Ipomania – 8.4%
 - X Psicosi – 15.5%
- (Holden e Gitlesen, 2003)
- Equivalenti Depressivi*
Rituali
Somatizzazioni
Apatia
Fobia
Cicli Rapidi
Disadattamento
Impulsività
Ossessività
Pseudoconvulsioni

APPROCCIO DIMENSIONALE

Disturbo del Comportamento

Comportamento Problema

Challenging Behavior*

*Difficoltà di
comunicazione*

Stress Ambientale

*Problemi
Somatici*

*Ritardo dello
Sviluppo*

Disturbi Psichiatrici

*Repetitive Self-Injury
Low-grade Disruptive
Behavior*

*Indecent Exposure
Sexual Abuse
Pica*

*Attempted Suicide
Grievously Injuring
Someone*

10%
(Lowe 2007)

CB è uno strumento di:

- ▣ Controllo socio-ambientale (evitare determinate attività o situazioni di stress)
- ▣ Comunicazione (attenzione, noia)
- ▣ Modulazione di disagio fisico (dolore, costipazione, effetti collaterali dei farmaci)
- ▣ Modulazione di disagio emozionale (depressione, ansia)

(Lowry e Sovener, 1991)

I Disturbi dello Spettro Autistico

➤ **70% ASD presenta DI**

➤ (Schwartz&Neri, 2012)

➤ **40% DI presenta ASD**

➤ (LaMalfa et al. 2004)

➤ **ASD aumenta di 2-3vv il rischio di problemi comportamentali, ansia, disturbi dell'umore, psicomotori, iperattività e deficit d'attenzione in DI (Hill&Furniss 2000; Bradley&Issacs 2000; Kauter et al. 2013)**

➤ **ID aumenta rischio di stereotipie, autolesionismo, attività ripetitive ristrette in AS**

**The most
challenging
of challenges**

Linee Guida per una Buona Pratica

Clinica

- **Approccio BioPsicoSociale - Piano di Cura Multidisciplinare**
- Continuo interscambio di informazioni con professionisti coinvolti
- Coinvolgimento di Familiari e CareGivers
- Definizione di sintomi o clusters target di una determinata terapia farmacologica
- Registrare informazioni: quadro clinico, razionale, prescrizione off-label, dosaggi
- Range di efficacia equivalenti alla popolazione generale e non maggiore suscettibilità a
- Ricorrere a prescrizione farmacologica solo se:
 1. altri tipi di intervento non sono sufficienti;
 2. terapie per altre comorbidità psichiatriche o somatiche non hanno ridotto il CB;
 3. c'è un elevato rischio di incolumità per il paziente o per gli altri
- Follow-up ≤ 3 mesi: risposta clinica, eff. avversi, revisione di terapia (discontinuation?)

- ✓ Presentazione clinica atipica – es. equivalenti depressivi comportamentali
- ✓ Inadeguatezza dei sistemi diagnostici e degli strumenti di assessment
- ✓ Difficoltà di comunicazione – misunderstanding del comportamento non verbale
- ✓ Storia clinica pregressa complessa – mancanza di documentazione
- ✓ Sintomi trasversali a diverse categorie categoriali – es. deficit competenze sociali

ANAMNESI

Multiple fonti di informazione

Comorbidità somatiche e terapie in atto

Funzionamento cognitivo

Funzionamento sociale e "lavorativo"

Situazione abitativa

Abitudini e Funzioni vegetative – sonno, alimentazione, ciclo mestruale

Pregressi eventi di vita stressanti e risposta

Modificazioni quotidianità: salute, terapie, operatori, residenzialità, attività

Cambiamenti – aspetto, sonno/appetito, ciclo mestruale, interazioni, comportamento, rendimento

ESAME OBIETTIVO

Aspetto, cura di sé, postura, mimica, espressività, sguardo

Eloquio e linguaggio non verbale

Contenuto e forma del pensiero

Cute, eventuali edemi, segni di autolesionismo

Parametri vitali e andamento BMI

ESAMI & TEST

Funz. tiroidea, funz. epatica e renale, elettroliti, TDM psicofarmaci in atto, ammoniemia, folati.

Behavior - emozionale, verbale, comportamentale, vegetativa
ECG

Consequences – rinforzo positivo, negativo, punizione
EEG, RMN encefalo

Valutazione neurocognitiva

VALUTAZIONE FUNZIONALE

Antecedent – interno, esterno remoto, esterno prossimo

Behavior - emozionale, verbale, comportamentale, vegetativa

Consequences – rinforzo positivo, negativo, punizione

Criticità nel Trattamento

- ✓ Tipologia di paziente spesso esclusa da letteratura scientifica
- ✓ Difficoltà di esecuzione di RCT
- ✓ Dati contrastanti
- ✓ Multiple comorbidità
- ✓ Drug-Drug interactions
- ✓ Difficoltà in diagnosi categoriale → frequente prescrizione Off-Label
- ✓ Ipersensibilità e effetti paradossi (vulnerabilità somatica)
- ✓ Sintomi trasversali a diverse diagnosi categoriali – es. deficit competenze sociali

Limited
Evidence Base

➤ **20-40% DI assumono psicofarmaci** (Deb 2006); *the most overmedicated group in s*

• **14-30% assume farmacoterapia per la gestione di CB, senza una diagnosi categorica**

Drug class	Clinical applications	Notes
Antipsychotics ²	Used across a broad range of behavioural disturbances. Most consistently useful for aggression and irritability	<p>The most important yet most controversial drugs for behavioural problems. Although a recent RCT³ cast doubt on their efficacy, the study was not without its problems and there is a significant body of other evidence supporting their use. Recent POMH-UK audit indicates that use by specialists is carefully considered and monitored</p> <p>Before the advent of atypicals, the best evidence was for haloperidol⁴ in the context of autism although the risk of dystonic reactions was high⁵</p> <p>Growing evidence for risperidone^{6,7} at low dose (0.5–2 mg) for aggression and mood instability (now licensed for short-term use), particularly with low-dose risperidone (Singh et al. 2010)</p> <p>Discontinuation studies suggest that longer-term treatment may be necessary in many cases</p> <p>Aripiprazole^{8,9} recently granted FDA licence for behavioural disturbance in young people with autism and its use is growing in the adult population, especially because of reduced risk of weight gain</p> <p>Some evidence to support olanzapine¹⁰ and case reports of clozapine¹¹ for very severe cases of aggression, but evidence is limited and unlikely to emerge outside specialist (inpatient) settings</p> <p>Results for quetiapine appear modest at best¹²</p>

• L'uso del **Risperidone** per trattare i CB in DI è **quantomeno questionable** (Singh et al. 2010)

• Non siamo in grado di trarre alcuna conclusione definitiva circa gli effetti cognitivi e comportamentali della **Clozapina** nei DI (Singh et al. 2010)

• 2 RCT su **Aripiprazolo** ...ma in età evolutiva e finanziati da casa farmaceutica... *evidence has to be interpreted with caution* (Deb et al. 2014)

Lithium²⁰

Licensed for the treatment of self-injurious behaviour and aggression

Some RCT evidence²¹ for LD though no studies in this population for many years: one positive RCT for aggression in adolescents without developmental impairment.²² Experience suggests lithium can be very helpful in individual cases where other treatments have failed and in some severe cases. However, side-effects can be problematic. Perhaps best considered where there is a subsyndromal or non-specific 'affective component'. Some authorities suggest that challenging behaviour may occur in the context of very rapid cycling bipolar disorder in some individuals with severe and profound learning disability and that the diagnosis is easily missed²³

BDZ - alterano soglia epilettica; provocano effetti paradossali, peggiorano compromissioni

Naltrexone²⁴

Has been used for severe self-injurious behaviour²⁵

Evidence not strong and results are inconsistent. Use may still be an option in severe and intractable cases.

Drug class

Clinical applications

Notes

SSRIs

Helpful for severe anxiety and obsessionality in autistic spectrum disorder. Use is off-licence unless an additional diagnosis of anxiety disorder or OCD is made. Also used as a first-line alternative to antipsychotics for aggression and impulsivity

Commonly used in specialist services in conjunction with SGAs though limited evidence base for combination treatment. Effectiveness in absence of mood or anxiety spectrum disorder is unclear and a recent Cochrane review was pessimistic¹³ about the evidence for their effectiveness for behaviour disorder in autistic children (who may be at heightened risk of adverse effects) though a little more encouraging in adults. Note quality of trials poor and effects may be exaggerated by use in less severe cases.¹⁴ Caution needed because of the risk of precipitation of hypomania in this population¹⁵

Anticonvulsants¹⁶

Aggression and self-injury

Some uncontrolled studies supporting **sodium valproate**¹⁷ in LD populations though evidence not strong and research findings contradictory. Remains best supported of the anticonvulsants for mood lability and aggression partly because of positive studies in the non-LD groups¹⁸

Terapia al Bisogno

**-Terapia regolare inadeguata? -Rischio di abuso
fattori scatenanti riconosciuti, e che non diminuiscono**

Limited studies of **lamotrigine**, mostly in children, suggest no effect, at least in autism and in the absence of affective instability¹²

Data for **carbamazepine** unconvincing, but still widely used¹⁹

Cosa facciamo già

- ☐ Protocollo di collaborazione ASSB-Serv. Psichiatrico (focus su accesso in PS e ricovero in SPDC)
- ☐ Discussione caso (progetto terapeutico-riabilitativo-educativo, interventi psichiatrici e psicologici)
- ☐ Intervento con e su caregivers - modificare dinamiche disfunzionali incancrenite, fornire strategie di coping con tutte le figure professionali coinvolte (educatori, operatori, psicologa, MMG, neurologo)
- ☐ Intra-visione del caso (approfondimenti diagnostici e intervento farmacologico) con responsabile del Modulo Riabilitazione Psichiatrica (dr. Basso) e Primario (Prof. Con)
- ☐ Consulenze esterne con specialisti competenti (es. Il Cerchio)
- ☐ Registrazione di consulenze e altre prestazioni, aggiornamento regolare della terapia su
- ☐ Scheda anamnestica per pazienti a maggior rischio di ricovero
- ☐ Diari e schede per registrazione sistematica di CB
- ☐ Follow-up ≤ 3 mesi, s.c. - rivalutazione clinica e revisione delle terapie, TDM regolari
- ☐ Progetto DAMA: visite ambulatoriali, integrazione con altri servizi e professionisti coinvolti

Cosa dovremmo fare ... e faremo!

- ✓ Implementazioni strumenti diagnostici e di follow-up standardizzati, il più possibile specifici per sottopopolazioni
- ✓ Formulazioni di protocolli di intervento individualizzati
- ✓ Adeguamento degli spazi di cura (luci, rumori)
- ✓ Real-life Studies
- ✓ Aggiornamenti multidisciplinari

Grazie

A collage of six vertical panels, each showing a close-up of a person's face with their mouth wide open in a shout or scream. The people are of various ethnicities and are wearing glasses. The background is a light, neutral color.

per l'Attenzione!